

Latanier rouge

Latanier de Bourbon, latanier de la Réunion, palmiste puce, pomme-latanier

Nom scientifique : *Latania lontaroides*

Famille : Arecaceae

Synonymes : *Latania rubra*, *Latania plagaecoma*, *Cleophora lontaroides*

Statut : endémique Réunion

Intérêt : ornemental, artisanat (palmes), mellifère, couverture des toits, fruits comestibles



DESCRIPTION

Photos : CIRAD (J.-M. Sarraïlh) - ASCONIT (G. Moynot)

Type biologique : palmier.

Taille : jusqu'à 12 m.

Port/forme : arborescent, dressé, robuste, avec une large couronne de palmes.

Tronc/tige : stipe solitaire, robuste à écorce brun gris, jusqu'à 25 cm de diamètre, strié horizontalement par les cicatrices foliaires. Base du stipe évasée et parfois fortement renflée

Racines : racine pivotante qui trace dans le sol.

Feuilles : persistantes, vertes, en éventail, insérées en hélice. Hétérophylle marquée : jeunes feuilles à marge rouge et épineuse devenant gris vert bleuté à l'âge adulte.

Fleurs : de couleur crème, groupées en longs épis d'1 à 2 mètres entre les feuilles. Fleurs mâles et femelles séparées sur des pieds différents.

J F M A M J Jt A S O N D

Fruits : gros fruit charnu globuleux et vert brillant, de la taille d'un œuf de poule, appelé « pomme latanier », contenant 1 à 3 graines dures (pyrènes) ovoïdes et diversement sculptées ou côtelées.

J F M A M J Jt A S O N D

Confusion possible : avec les autres *Latania* endémiques de Maurice (*Latania loddigesii*) et de Rodrigues (*Latania verschaffeltii*).

ÉCOLOGIE

Habitat :

végétation littorale, savane à lataniers, planèzes et ravines de l'étage semi-sec jusqu'à 1000 m d'altitude (cirques de Mafate et de Cilaos) sur la côte sous le vent.

Reproduction :


sexuée dioïque.

Liens faune/flore :

Relation mutualiste avec *Phelsuma inexpectata* qui se nourrit du pollen et du nectar, ce qui permet en retour la pollinisation. Fruit probablement consommé à l'origine par les tortues et scinques crétois qui le disséminaient

La choisir en fonction de son environnement

Zones favorables :



Latanier rouge

Latanier de Bourbon, latanier de la Réunion, palmiste puce, pomme-latanier

EXIGENCES

Sol : bien drainé, frais riche et acide. Un sol même superficiel et caillouteux peut convenir.

Lumière : zone ensoleillée.

Eau : espèce résistante à la sécheresse (semi-xérophile) et sensible à trop d'humidité (ne convient pas dans l'Est de l'île).

Autres : espèce préférant des conditions de températures relativement chaudes (mégathermophile).

CULTURE

Croissance : moyenne, plus lente que celles des autres palmiers.

Plantation : individus isolés ou en alignement ou en massif (boisement), convient en arrière-littoral (sensibles aux embruns directs).

Entretien : élimination des feuilles fanées ; les fruits attirent les rats.

Multiplication : semis.

USAGES

Pharmacopée : -

Alimentation : les jeunes graines des fruits (endosperme) sont comestibles et également utilisées pour faire du rhum arrangé.

Bois : également utilisées pour faire du rhum arrangé.

Divers : feuilles autrefois utilisées pour couvrir les cases et servir d'ombrelle. Palmier utilisé comme emblème dans l'île et dans certains quartiers (Grands-Bois, La Possession...).