

Scutia myrtina

Famille : Rhamnaceae

Noms vernaculaires : Bois de sinte, Bois de ronce, Le sinte, ronce (R.) ; Bambara (R., M., Ro) ; Bois senti (M., Ro., Sey.)

Synonymes : *Scutia commersonii*, *Rhamnus myrtina*, *R. lucida*

Statut : indigène (Afr., Madag., Mascar., Seych., Asie)

Intérêt : haies défensives, médicinal, mellifère



Photos : CBNM (J. Hivert / S. Française)

DESCRIPTION

Type biologique : arbrisseau ou arbuste sarmenteux.

Taille : jusqu'à 10 m en sous-bois et 4 m en milieu découvert.

Port/forme : buisson prostré très épineux en milieu ouvert, à tiges grimpantes et retombantes en sous-bois forestier.

Tronc/tige : de 8 à 10 cm de diamètre, avec des crochets épineux acérés sur les rameaux ; écorce brune à noirâtre, subéreuse et fissurée ; aiquillons dressés sur les plantules ou reiets à la base des feuilles.

Racines : -

Feuilles : simples, opposées, coriaces, petites, ovales, vert foncé brillant dessus et vert pâle dessous, variables par leur taille et leur forme selon l'âge et les conditions.

Fleurs : petites, à 4 ou 5 pétales blancs verdâtres, de 2 à 20 fleurs groupées en cymes à l'aisselle des feuilles.

Fruits : charnus globuleux, pourpre foncé à noirâtres, mesurant moins d'un cm et contenant 2 ou 3 graines ; pulpe farineuse, blanchâtre et aromatique.

ÉCOLOGIE

Habitat :

Mascareignes : savanes, fourrés et forêts (semi-secs) de 0 à 900 m d'altitude.

Seychelles : fourrés à Ochna et Apodytes.

Reproduction :

sexuée hermaphrodite.

Liens faune/flore :

fruits consommés par les oiseaux qui assurent la dissémination ; fleurs fréquentées par les abeilles (mellifère).

Distribution Masc. & Seych. :

Réunion : peu commun ; massif de La Montagne et Grande Montagne, Dos d'Ane, Mafate, Colorado, Savanes de Trois-Bassins, St-Leu, Ch. du Bois de Nèfles, Dimitile, Cilaos, Grand Bassin ; rare dans l'est.

Maurice (Rodrigues) : assez fréquente dans les fourrés et forêts de basses et moyennes altitudes.

Seychelles : assez commun au sein de son habitat ; Aldabra.



La choisir en fonction de son environnement

Scutia myrtina

Bois de sinte, Bois de ronce, Le sinte, ronce (R.) ; Bambara (R., M., Ro) ; Bois senti (M., Ro., Sey.)

EXIGENCES

Sol : plutôt sec, mais indifférent à la qualité du sol (ferralitique à bréchique).

Lumière : espèce héliophile, mais tolérante à l'ombre d'un sous-bois clairsemé. Jeunes stades capables de se développer à l'ombre (hémisciaphile).

Eau : tolère les milieux arides, indifférente à l'hygrométrie atmosphérique, sans toutefois trop d'humidité (hygro-indifférente).

Autres : espèce préférant des conditions de températures chaudes (mégathermophile).

CULTURE

Croissance : très rapide.

Plantation : isolée, en massifs ou haies décoratives et défensives ; attention aux épines recourbées pouvant provoquer des blessures.

Entretien : susceptible d'être taillé.

Multiplication : semis.

USAGES

Pharmacopée : utilisé traditionnellement contre la fièvre, les diarrhées, les refroidissements et la jaunisse (écorce tonique et astringente).

Alimentation : -

Bois : -

Divers : -